




Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou

ročník 6, série 4

2007/2008

Zajíček Chemik



3. <http://en.wikipedia.org> – první místo, kam se je většinou vhodné podívat.

Model hoření

4. COTE, Artur E., *NFPA Fire Protection Handbook*, 19th ed.: National Fire Protection Association 2003.
5. <http://www.nfpa.org>
6. TURNS, S. R., *Introduction to Combustion: Concept and Applications*, 2ed.: McGraw-Hill, 2000.

Lidské svíčky

7. Christensen, A. M. *Experiments in the Combustibility of the Human Body*. Journal of Forensic Sciences 2002 (47): 466-470.
8. Selvaggi G, Hoste S, Tondu T, Landuyt KV, Handi M, Blondeel P & Monstrey S. *Spontaneous combustion*. J Burns & Surg Wound Care⁹ 2003 (1): 14.

⁹<http://www.journalofburns.com>

rychle shořet na popel. A to aniž by se plameny nějak zásadně dotkly okolí.
První popsaný případ spontánního uhoření se udál v roce 1662. Jonas Dupot roku 1763 publikoval práci *De Incendiis Corporis Humani Spontaneit*, ve které vyložil první dvě protikladné teorie o tomto fenoménu:
Podle první teorie předpokládal, že se v těle pohybují zvláštní látky tzv. „humory“. Jejich zrychlěný pohyb podle něj měl analogii v procesech, které v neživotné přírodě vedou k teplu a ohni.

Podle druhé teorie způsobovalo teplo tření mezi nejmenšími částečkami v krvi a jiných tělních tekutinách v průběhu jejich cirkulace tělem.

Samovznícení se posléze stalo oblíbenou literární metodou, kterou ve svých dílech využili k odstranění postavy i takoví autoři jako trčba Charles Dickens, Honoré de Balzac či Mark Twain. Popisovalo se jako nadpřirozený jev.

K jeho osvětlení potřebujeme odpověď na tři otázky – (1) Byl či nebyl příponem zdroje tepla? (2) Proč se nic nestávalo okolí? a konečně (3) Jak může člověk jen tak shořet?

Při hledání odpovědi na první otázku se ukázalo, že ve většině případů samovznícení byl ve skutečnosti přítonem i zdrojem tepla – nejčastěji cigaretou nebo dýmkou.

Experimenty se spalováním hovězí a lidské tkáně pak odpovídaly na druhou otázku. Prokázaly, že hořením tkáně vzniká tak málo tepla, že oheň se nemůže sítřit vne těla. Nemá k tomu dost energie.

Nejdůležitější a nejtěžší otázka ale je otázka, jak může člověk shořet? Jistě si vzpomenete, co jsem psal o kremaci a poměrně zachovalých byť zuhelnatělých tělech po požáru. A nejlépe zatím odpovídá teorie „hořícího knoutu“, kdy jako knot „svíčky“ funguje oblecení (nejlépe posypané popelem z cigarety) a takovou lidskou svíčku pak živí tělesný tuk tak dlouho, dokud není spálena většina těla a nezůstane jen popel a hornádka kostí.

Lidské tělo se tedy skutečně může vznítit, shoret a netknout při tom své okolí, ale neučinit tak samo.
Skončím seriál o detektivní chemii jasným poselstvím: **Kouření škodí zdraví.**

Literatura

Hlavní prameny

- Bell, Suzanne. *Forensic Chemistry*. 1st edition.: Pearson Education, 2006. 614 s. ISBN 0-13-147835-4.
- LYLE, Douglas. *Forensics for Dummies*. 1st edition.: Wiley Publishing, 2004. 356 s. ISBN 0-7645-5580-4.



Korespondenční seminář probíhá pod záštitou
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Hlavova 20/30
128 43 Praha 2

Milí příznivci chemie i ostatních přírodnovědných oborů!

Právě dříše v rukou zadání úloh Korespondenčního Semináře Inspirovaného Chemickou Tematikou, KSICHTu. Už šestým rokem pro vás, středoškoláky, KSICHT připravují studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Seminář je podporován v rámci Rozvojového projektu C10-2b/2008.

Jak KSICHT probíhá?

Korespondenční seminář je soutěž, při níž si vy, řešitelé KSICHTu, dopisujete s námi, autory, a naopak. Vy nám poslete řešení zadaných úloh, my vše opravíme, ohodnotíme a zašleme vám je zpátky s přiloženým autorským řešením a pěti úlohami nové série. To všechno se za celý školní rok čtyřikrát zopakuje.

Jak se tedy můžete stát řešiteli KSICHTu?

Není nic jednoduššího! Stačí se jen *zaregistrovat*¹ na našich webových stránkách. Řešení nám poté můžete poslat buď klasicky na adresu **KSICHT, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2** nebo elektronicky přes *webový formulář*² jako soubory typu PDF.

V případě jakýcholiv dotazů či nejasností se na nás prosím kdykoliv obraťte e-mailem **ksicht@natur.cuni.cz**.
Každou úlohu využracijte na zvláštní papír (aspoň formátu A5, menší kusy papíru mají totiž tendenci se ztrácet), *uveďte svoje jméno, název a číslo úlohy!* Řešení pište čitelně, vězte, že nemůžeme považovat za správné něco, co nelze přečíst.

V případě, že posíláte úlohy přes webový formulář, uložte každou úlohu do *samosatného souboru typu PDF* a nezapomeňte v záhlaví každé stránky uvést svoje jméno, název a číslo úlohy! Více informací o elektronickém odesílání

¹<http://ksicht.natur.cuni.cz/prihlaska>

²<http://ksicht.natur.cuni.cz/odeslani-treseni>

řešení naleznete přímo na stránce s formulářem. *Neposlejte nám prosím naske-novaná řešení*, neboť jsou často velice špatně čitelná. Výjimkou jsou nakreslené a naskrovené obrázky, které připojíte k řešení napsanému na počítaci. Řešení by nemělo ztratit smysl ani po vytisknutí na černo-bílé tiskárně.

Do řešení také pište všechny vaše postupy, kterými jste dospejli k výsledku, neboť i ty budujeme. Uveděte raději více než méně, protože se může stát, že za strohou odpověď nemůžeme dát témer žádne body, ačkoliv je správná.

Anketa

Anketu vyplnilo rekordních 42 řešitelů, tj. 2/3 řešitelů 3. série, velmi děku-jeme. Z letošních nových řešitelů se vás s KSICHTem seznámilo 15 ve škole, 7 na Běstvině, 5 na Internetu a 5 jinde. V loňském ročníku se vám nejvíce líbilo „Sudoku“, za ním skončila „Skrývačka“ a „Patero bílých prášků“, které získaly shodný počet hlasů. Z letošních tří sérií se vám nejvíce líbil „Ideální ostrov“, který zvilo 10 řešitelů, druhé místo patří úloze „Kdopak je tatínek“ s pěti hlasů a třetí místo úloze „Sladká“ se čtyřmi hlasů.

Ulohy byste většinou chtěli takové, jaké souvisí s každodenním životem (30 hlasů) a které se týkají novinek ve výzkumu a laboratoří (21 hlasů). V jiných typech úloh jste zminili snad všechna možná odvětví chemie, takže se pokusme tuto rozmanitost dodržet. Je třeba si ale uvědomit, že každý má jiné záliby a že to, co se líbí jednomu, se nemusí líbit druhému. Věříme, že z nabízených úloh vás aspoň jedna potěší a že ty, které nepotěší vás, potěší někoho jiného. Nejčastěji se chystáte studovat chemii – VSCHT (10), PřF UK (5), chemické vysoké školy v Brně (5) – a medicínu (10). Sedm z vás ještě není rozhodnuto. Na zálužnou otázkou „Kam se chystáte?“ jste dost často psali specifikaci studia na vysoké škole nebo udílené smajlifky. Od ostatních jsme se dozvěděli, že jdou odeslat řešení na poschu, najít se nebo napít do knuchyně, někteří sliš k počítací, jiní spát.

V příštím ročníku bude vycházet seriál o nanočásticích, i když výsledky jsou velmi těsné. Pro tento návrh jste se vyslovili 117 body. 103 bodů získala fluorovaná chemie, následovaná nukleární magnetickou rezonancí se 101 bodem. Závěrem mnohokrát děkujeme za vaše děkovné dopisy. Budeme se i nadále snažit vest KSICHT k vaší spokojenosti.

Soustředění KSICHTu

Od 9. do 13. června se v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy uskuteční soustředění KSICHTu. Na programu budou přednášky z různých oblastí chemie a práce v laboratoři. Laboratorní úlohy se budeme snažit sestavit tak, aby si na své příšel jak začátečník, tak i zkušený chemik. Samozřejmě

řešení na stránce s formulářem. *Neposlejte nám prosím naske-novaná řešení*, neboť jsou často velice špatně čitelná. Výjimkou jsou nakreslené a naskrovené obrázky, které připojíte k řešení napsanému na počítaci. Řešení by nemělo ztratit smysl ani po vytisknutí na černo-bílé tiskárně.

Do řešení také pište všechny vaše postupy, kterými jste dospejli k výsledku, neboť i ty budujeme. Uveděte raději více než méně, protože se může stát, že za strohou odpověď nemůžeme dát témer žádne body, ačkoliv je správná.

Závěrem mnichokrát děkujeme za vaše děkovné dopisy. Budeme se i nadále snažit vest KSICHT k vaší spokojenosti.

Tyto zbytky se od hlavně šíří kuželovitě do vzdálenosti zhruba 0,5 metru. Jejich složení se mění se vzdáleností – těžší částice doletí dál. Složení se tedy dá použít k určení priblížené vzdálenosti střelec od oběti. A to nejčastěji pomocí mikroskopického vzhledu vzniklých částic Pb-Sb-Ba a také pomocí jejich elementární analýzy. Je navíc nutné tyto ukazatele kombinovat, protože částice obsahující Pb-Sb-Ba se vytvářejí třeba při brzdění auta, ale vypadají trošičku jinak.

Mezi zbytky po výstřelu je možné najít i organické látky, ale ty většinou na místě nevydrží dlouho. Jedná se nejčastěji o zbytky střelivin a zhruba odpovídají složení patrony.

Zkoumání výbušnin

S asi nejčastějším zařízením na testování výbušnin se můžete potkat na letištích. Jsou to oblibené rámy, kterými se prochází při kontrole zavazadel. Jde o *iontovou mobilní spektrometrii* (IMS) a kromě detekce výbušnin se používá i k detekci drog.

Sice jsme ji už probírali v druhém dílu seriálu, ale zde se na chvíli zastavíme u typu jednotlivých iontiů, jaké v IMS detektujeme.

IMS je založena na elektroforetické separaci iontově-molekulárních shluků podle poměru hmotnosti a délky. Může se nastavít tak, aby zachytily bud kladné, nebo záporné ionty, přičemž pro detekci výbušnin se nejčastěji používá detekce anionů typu dusičnanů nebo dusitanů.

Z rámu je odebíráno vzduch a ten se ionizuje pomocí zářiče ^{63}Ni . Ve vzduchu vzniknou nejčastěji ionty $\text{O}_2^- \cdot (\text{H}_2\text{O})_n$, kde n je počet shluhkuntych molekul vody. Ty posléze narážejí na jiné molekuly a vznikají pak další fragmenty. Určitý problém představují organické výbušiny, které neobsahují ionty, ale jsou neutrální jako třeba nitroglycerin nebo RDX. Ty se aktivněji pomocí iontu Cl^- , který se vytváří dopováním vstupního vzduchu o dichlormethanu. Vznikají pak shluky $\text{M} \cdot \text{Cl}^- \cdot (\text{H}_2\text{O})_n$, jako třeba RDX $\cdot \text{Cl}^- \cdot (\text{H}_2\text{O})_n$ a ty už se detekovat dají.

Horská je, že IMS není schopna rozpoznat výbušninu ukryté v tekutinách, neboť netékají, a tak se dnes do letadla s pitím nedostanete.

Donedávna byla také určitou nevýhodou IMS velikost, ale jako ve většině oborů se snaží výrobci změnit zařízení tak, aby byly IMS přenosné, dokonce se uvažuje o velikosti čípu.

Stvořování

Zakončím tento díl zamýšlením nad jedním mýtem držícím se ve forenzních vědách. lidské tělo se prý může jakýmsi záhadným způsobem samo vznítit a

Po plynných urychlovačích hoření sice nezůstanou žádné stopy, ale zůstane po nich nádoba, v které byly na místo přepraveny. Po pevných zůstane aspoň popel, ale nejlépe se analyzuji kapalné urychlovače.


Jak je patrné z obrázku 3, kapalina těsně u země nelohří, a tak může zůstat po požáru neshořený urychlovač ukrytý v nějaké škvíře. Proto se sbírají vzorky zbytků po požáru tak, aby se uložily v neprodrysných nádobách s dostatkem volného prostoru.

Kapalná látka bude v rovnováze se svými parami, a tak se prostor nad zbytky nasytí párami urychlovače. Nicméně takto ukryté kapaliny se postupem času z místa činu odpaří, proto je třeba je sesbírat co možná nejrychleji. Vzorek se poté zkouná pomocí plynové chromatografie, nejlépe s pomocí hmotnostní spektrometrie jako detektoru (GC-MS). Ten jsme už potkali v druhém dílu seriálu, a tak pokročíme dále.

Zkoumání střelby

Když vypadá ze zbraně (nemyslím z praku nebo vzduchovky), kromě projektílu z hlavně vyletí zbytky nespálených střelin, pojiv, podobně jako spaliny a zbytky po rozbrušce (obrázek 4). Především rozbruška je vhodným objektem pro zkoumání, díky tomu, že obsahuje těžké kovy, které se posléze dají analyzovat.

Jako rozbruška se nejčastěji používá směs styftánu olovnatého⁸, sulfidu antimoniitého a dusičnanu barnatého. Nicméně se dnes začínají používat i bezolovnaté rozbrušky.



Obrázek 4: Zábělovková fotografie výstřelu z pistole (vlevo) a detail růstí hlavně v okamžiku výstřelu (vpravo); zdroj: Aaron Brudenell, Tucson Crime Laboratory

⁸2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diolát olovnatý

³<http://ksicht.natur.cuni.cz/akce-ksichtu/6>
⁴<http://ksicht.natur.cuni.cz>

nebudou chybět ani hry na odreagování a večerní program. Ubytování bude brazeno.

Máme kapacitu pro 30 účastníků, pokud se vás přihlásí víc, bude rozhodovat počet bodů. Máte-li zájem, určitě se přihlašte, bez ohledu na to, jak si ve výsledkové listině stojíte.

Pokud se chcete soustředění zúčastnit, vyplňte prosím co nejdříve formulář³ na webových stránkách KSICHTu. Podrobnosti o soustředění zveřejníme na odkazované stránce v květnu, kdy vás rovněž budeme informovat e-mailem.

KSICHT na Internetu

Na webových stránkách KSICHTu⁴ naleznete brožurku ve formátu PDF a rovněž aktuální informace o připravovaných akcích.

Pokud máte dotaz k téze, můžete se zeptat přímo autora na e-mailové adresy ve tváru jméno.příjmení@ksicht.natur.cuni.cz. Jestliže má úloha více autorů, píšte prvnímu uvedenému.

Errata

Autoří této Ideální ostrov se hluboce omlouvají za chybu v řešení otázky 1. Správný postup při rozdělání ohně s Dannymho brýlemi (je krátkozraký, takže vlastní rozptylky) je jejich spojení po předchozím naplnění vodou. Všechn řešitelům, kteří takto autoři nechťěně připravili o body, se ještě jednou omlouvají a tímto je žádají o zaslání jejich řešení, nejlépe oskenovaných e-mailem, pro opravu jejich bodového ohodnocení.

Opravené podoby brožury naleznete vždy na webu KSICHTu jako PDF.

Termín odeslání 4. série

Série bude ukončena **28. dubna 2008**. Vyřešené úlohy je třeba odeslat nejpozději v tento den (rozhoduje datum poštovního razítka či čas na serveru KSICHTu).

Úvodníček

Drahé ksichtáčky, draží ksichtáči!

Tak nám opět začalo jaro. Chtělo by se skoro říci, že v tomto období pučí úplně všechno. Využiji tedy nabízené příležitosti a půjčím si také jedno jarní říkadelo:

Sněženka (F. Hrubín)

Táta včera na venku, našel první sněženku,
vedle petrklíč, zima, už je prýč!

Nevím jak vám, ale mně osobně připadá tento druh infantilní poezie velmi občerstvující. V tétočto veřejším prostě nemí ani stopa po globálním oteplování, humanitární krizi v Dárfúru, ekonomické recesi v USA, nebo poplatcích u lékaře. Vždycky mi příšlo lito, že třeba MF DNES nemívá nějaký podobný rým vtipštěný palcový titulky na titulní stránce.

Stejný postup bych uplatnil i v Televizních novinách. Rey Koranteng by ho mohl vždy přečíst jako první zprávu dne. Představuj si to tak, že by nejprve umělecky přednesl básen Chumeli se chumelí a teprve poté oznamil, že vlivem sněhové bouře došlo k několika automobilovým nehodám a větrem polámané stromy přenušily elektrické vedení na mnoha místech ČR. Člověk by to hned přijal s větším klidem.

Co naplat, tento nápad nejspíš neprojde. Vy však alespoň nyní dostanete příležitost si oddechnout od pěny dñí díky našim novým úlohám. Co vás čeká a nemine?

Rozehráť mozkové závity a rozepsat své propisy budete moci u tradiční osmisměrky. Tentokráté s tematikou chemického nádobi. Aneb děti, kdo ví, jaký je rozdíl mezi homolem a heteromolem? Jako třetí v pořadí na nás čeká drobná připomínka ducha Velikonoč a jeho následovníků. Je již dlouhodobě a všeobecně známo, že přemýšlet nad tím, proč by se nemohli mít všichni lidé rádi a že by si měli nezíštně pomáhat, vás může přivést do pěkné šlamastíky. Venme si z toho ponaučení. Na druhou stranu nic není černobílé. Což dokazuje i úložka následující. Radioaktivita například nemí jen prostředkem atomových štváčů proti pokojně pracujícímu lidu, ale i celkem užitečná věc v syntetické chemii. Roli syntetického chemika si budete moci otěstovat dosytosti. A pokud by se vám přeci jen zastesklo po roli atomového štváče, pak je pro vás úloha poslední s názvem Atomic Bomberman jak vyštítá.

Mějte se všichni hezky a doufám, že se s vám uvidím osobně na výletě, či alespoň na soustředění.

Honza Havlík

Táta včera na venku, našel první sněženku,
vedle petrklíč, zima, už je prýč!


První známou střelivinou byl **černý střelný prach** starých Číňanů. Jde o směs 15 % uhlíku, 10 % síry a 75 % ledku (dusičnanu draselného). Jeho nevýhodou byla tvorba černého dýmu, která nejen že prozrazovala pozici střelce, ale v případě bitvy za chvíli nikdo nikoho neviděl.⁷ Číňané samozřejmě nepoužívali střelný prach jen na ohňostroje, ale také vymýšleli první palné zbraně. Nejstarší design téchto zbraní byl tzv. „ohnivý ostěp“ a slo vlastně o plamenomet, do kterého se přidaly malé projektily. Později zbraně pak omezily ohnivou část a připomínaly spíše brokovnici.

Nevím jak vy, ale rozhodně bych se coby mongolský nájezdník necítil dobře, kdyby na mě mířil „Hromový vrhač ohně s devíti průraznými magicky otrávenými šípy“.

Koncem 19. století se začaly objevovat **bezdýmné střelné prachy**, založené většinou na směsi nitrocelulózové želatiny. Recept na bezdýmný střelný prach dále vylepsil Alfred Nobel přídáním nitroglycerinu. A dnes jsou střelné prachy ještě doplněny stabilizátory a hygroskopickými látkami na ochranu před vlhkostí a pojivy.

No dobré, už víte, co a jak hoří, i pář divných výpočtu u výbušnin jste se naučili, zastřílet jste si zastríleli, ale co se vlastně zjišťuje na místě činu? **Zkoumání ohně**

U ohně je prvním ukazatelem jeho stopy. Podle ní se dá určit, kde ohně začalo (viz obrázek 3). Ze vzhledu místa zdroje ohně se dá určit, zda byl k jeho zapálení použit nějaký urychlovač hoření, ať už plyn (methan), kapalina (benzin) nebo pevná látka (papír). A také by na místě mělo být zápalné zařízení, třeba sirka, zapalovač nebo zkratovaná zásuvka.







Obrázek 3: Šíření hořavin v prostředí a určení zón, kde koncentrace zabránil hoření

⁷To byl hlavní důvod, proč byly uniformy v napoleonské době tak jasně barevné.

Zadání úloh 4. série 6. ročníku KSICHTU

Úloha č. 1: Osmisměrka

Stejně tak, jako nemůže být chléb bez soli, neobejdě se chemik bez chemického nádoby. Umíte se v této „kuchyni“ správně orientovat, nebo jste osouzeni k „neshlané dietě“?

Typ	Výbušnina	Struktura	Rychlosť [m s ⁻¹]	Silový index PI – viz (4)
Slabá	Azid olovnatý – rozbušky	Pb(N ₃) ₂	2300	14
Silná	Nitroglycerin – dynamit, střelný prach		7750	171
Silná	Kyselina pikrová – standard pro poro- vnávání explozivní- ho indexu		7900	100
Silná	TNT – oblíbená ko- merční výbušnina		6850	331,2
Silná	RDX – Hexogen – vojenská trhavina		8440	457

Tobacco 2: Pancreatic cancer: tobacco

Jak jsme už říkali, síla výbušin je definována podle množství tepla a objemu tloušťky, které vymrští. Relativní sílu pak uvádí rovnice

$$PI = \frac{QV_{\text{vybušnina}}}{\dots} \cdot 100.$$

kde se porovnává součin tepla Q a vyprodukovaného objemu plynu V v porovnání s kyselinou pikrovou. Výbušniny s PI menší než 100 jsou označovány jako slabé. Jsou většinou citlivější, a proto se používají v rozbitníkách. Výbušniny s větším PI jsou označovány jako silné a k jejich výbuchu je nejčastěji

Poslední skupinou výbušnin jsou **střeliviny**. Je povětšinou o homogenní práškové směsi, které mají pomalejší a kontrolovatelnější hoření, než by měly samotné výbušniny, neboť jednolitou strukturu se výbuch šíří rychleji. Pokud by byla rychlosť hoření příliš vysoká, houveň by explodovala; pokud by byla příliš nízká, naboj by letel menší rychlosťí a tedy i nepřesněji.

1. Ke každému nádobi přířaďte jeho název (v některých případech i více-slovny – víceslovné názvy nejsou odděleny mezerou), který následně za-škrtnete v osmismérce. Pokud pro daný typ nádobi existuje více názvů, uvedte ten, jenž naleznete v osmismérce. Osmismérku nám posílat ne-musíte, postačí názvy nádobí přiřazené k jednotlivým čísly (vzestupně).

2. V osmisměrce se vyskytujují názvy dvou věcí, které nejsou zobrazeny na obrázku 1, nepatří k chemickému nádobi, ale v laboratoři jsou naprosto nepostradatelné. Zaškrtněte a uveďte tyto dvě pomůcky.


3. Nevyškrtnuté znaky (včetně mezer apod.) tvoří tajenu. Napište ji.

Upozornění: Písmeno CH je považováno za dva znaky, tzn. za C a H.

4. Řazení nádobí na obrázku 1 není náhodné. Podle čeho je seřazeno?

5. Jaké další typy nádobí číslo 35 existují? Který z nich je zobrazen na obrázku 1?

6. K čemu slouží nádobí číslo 40? Jakými sloučeninami bývá nejčastěji naplněno?



Dokončení vtipu je uvedeno v tajence.

2. V osmisměrce se vyskytujují názvy dvou věcí, které nejsou zobrazeny na obrázku 1, nepatří k chemickému nádobi, ale v laboratoři jsou naprosto nepostradatelné. Zaškrtněte a uveďte tyto dvě pomůcky.

3. Nevyškrtnuté znaky (včetně mezer apod.) tvoří tajenu. Napište ji.

Upozornění: Písmeno CH je považováno za dva znaky, tzn. za C a H.

4. Řazení nádobí na obrázku 1 není náhodné. Podle čeho je seřazeno?

5. Jaké další typy nádobí číslo 35 existují? Který z nich je zobrazen na obrázku 1?

6. K čemu slouží nádobí číslo 40? Jakými sloučeninami bývá nejčastěji naplněno?

Hoření totiž není jednoduché srážení se molekul paliva s molekulami okysličovadla, jak by nás mohlo napadnout ze srážkové teorie. Jde o řetězovou reakci, která je iniciována tvorbou volných radikálů. Ty se posléze propagují srážkami a dalšími rozpady neutrálních molekul. Zanikají až srážkou dvou radikálů. Pokud je rychlosť propagace větší než rychlosť zániku, tak se reakce šíří.

Prenos tepla

Nejjednodušší model plamene je model adiabatického plamene – ohřívají se pouze produkty reakce. Už tento model nám ukazuje, že při jiném než stechiometrickém poměru je dosažená teplota nižší o ohřev nereagujících čistic.

Ale teplo také proudí i jinam – teplý vzduch studený, takže znacná část tepla „odvane“. Ohřev také ohřívá dřevo, které se zplyňuje a tyto zplyněné uhlovodíky ohřej dál živí. Oheň však ohřívá dřevo hlouběji, než kam se dostane kyslík. Ze dochází k tepelnému rozkladu – pyrolýze – v reduktivním prostředí. Pyrolýzou vznikají jiné látky než hořením, a proto vypadá zasažená část jinak než popel po hoření.

No dobré, ale co odlišuje hoření a výbuch?

Rychlosť reakce. Nic víc, nic méně. V případě hoření se tvoří odpadní plyny poměrně pomalu a mají dostatek času šířit se do okolí, takže se příliš nevyvíjí tlak.

Naopak u výbuchu se vytrácejí plyny natolik rychle, že je nemí schopno okolí absorbovat a rostou tlak. Mezi místy s rozdílnými tlaky pak vznikne tlaková vlna, která je odpovědná za destrukční účinky výbuchu. Pokud rychlosť tlakové vlny nepřesáhne rychlosť zvuku v daném prostředí, jedná se o deflagraci. V opačném případě se jedná o detonaci.

Vztah pro rychlosť zvuku na vzduchu přibližně popisuje rovnice:

$$v = 331,4 + 0,6t \text{ [m s}^{-1}\text{]}, \quad (3)$$

kde t je teplota v °C. Pro 25 °C je rychlosť zvuku podle rovnice (3) 347 ms⁻¹.

Vzhledem k tomu, že se uvolňuje teplo, a to je záporně vztahem entalpii ($Q = -\Delta H$), vidíme, že entalpie klesá ($\Delta H < 0$). Pokud je tedy změna entropie kladná a změna entalpie záporná, znamená to, že záporná bude i změna Gibbsovy volné energie a reakce bude samovolná.

Hoření vyprodukuje jak určitý objem plynu V , tak i teplo Q , a proto se k výjádření sily hořavin a speciálně výbušnin používá součin QV . Nejsilnější výbušnosti jsou ty, které vyprodukují nejvíce plynu při co nejvyšší teplotě. Nicméně, neměli bychom zapomínat na vliv složení směsi. Nejlépe reakce poběží, pokud bude zajistěna ideální stechiometrie složek směsi, tedy například k hoření 1 molu methanu budeme používat přesně 2 moły kyslíku. Ne vždy tomu tak ale je. Zavedeme si poměr Φ mezi složením směsi a složením ideálním

$$\Phi = \frac{(P/O)_{\text{sys}}}{(P/O)_i} = \frac{(m_P/m_O)_{\text{sys}}}{(m_P/m_O)_i} = \frac{(n_P/n_O)_{\text{sys}}}{(n_P/n_O)_i}, \quad (2)$$

kde sys označuje aktuální a i ideální směs, P je palivo a O okysličovadlo a m je jejich hmotnost a n je látkové množství.


Hodnota poměru Φ ukazuje, jaké bude spalování směsi⁶:

- **stechiometrická směs** ($\Phi = 1$) – ideální směšovací poměr, nejvyšší dosažitelná teplota;
 - **chudá směs** ($\Phi < 1$) – směs je překysličena, teplo se spotřebuje i na ohřev nepoužitého okysličovadla, teplota a tím i účinnost spalování je nižší;
 - **bohatá směs** ($\Phi > 1$) – v systému je nedostatek okysličovadla, spalování je nedokonalé, tepla se uvolní méně.
- K hoření navíc dojde jen v případě, že se Φ blíží jedné. Jestliže je v systému příliš mnoho okysličovadla, nebo naopak paliva, k hoření nedojde (viz tabulka 2). Proto taky vybuchují pouze prázdné nádrže s benzínem, a ne nádrže zcela naplněné...

Kinetika hoření

Ono se řekne hoření, ale jaký je vlastně jeho mechanismus? Překvapivě složitý. Například u hoření methanu je mechanismus založen na 277 elementárních reakcích, při hoření vzniká 49 meziproduktů. A to jsme vyslali z jednoduché látky, nikoli například z benzínu, který je směsí už na počátku.


⁶Φ je vlastně pěvrácenou hodnotou λ-faktoru, o kterém ještě mohli slyšet u popisu autobilových katalyzátorů. Jde o přebytek kyslíku v spalovací směsi. Tzv. λ-sonda hledá složení výfukových plynů a počítá upravuje míchání paliva pro motor tak, aby se snížily emise.



Obrázek 1: Chemické nádoby použité v osmisměře

Úloha č. 2: Demografie trochu jinak


Autor: Radek Matuška a Václav Kubát



Bylo jednou jedno malé město s velmi poeticím názvem Avogadro. Psal se tehdy rok 6022 a v Avogadrovi žilo přesně 12345 čtyřčlenných rodin. A v onom roce lidumilný starosta tohoto krásného a prosperujícího města (jmenoval se mimochodem Amedeo) řekl, že počet rodin ve městě je přesně jeden homol. A od té doby se v Avogadrovi počítá počet obyvatel jen v těchto jednotkách. A to by nebyla demografie, když by se do toho nezačaly plést nějaké další veličiny... .

1. Starosta byl dokonce tak troufalý, že zavedl jakousi demografickou konstantu, kterou po sobě pojmenoval. Jaká je tedy hodnota Amedeovy konstanty, pokud jako jednotkový objekt zvolíme rodinu?
2. Předpokládejme, že průměrná čtyřčlenná rodina Avogadrova váží kolem 240 kg. Jaká je potom homolární hmotnost celého Avogadrova?
3. Kolik homolu přestavuje jedna rodina? A kolik jeden člověk? Kolik homolu lidí je v Avogadrovi?
4. Rozloha našeho Avogadrova 650 jiter. Jaká je homolární koncentrace obyvatel v Avogadrovi v homolech na jítro?
5. Na začátku jsme ale řekli, že Avogadro je poměrně dobré prosperující město a v roce 6626 už bylo v Avogadrovi 123456 rodin. Kolik rodin v jednotkách homol je nyní ve městě? Jak se změnila homolární hmotnost města, pokud obyvatelé Avogadrova netlusknou, narodzí od lidí v mnoha dnešních zemích.
6. Jak rychlý je přírůstek obyvatel v demografických jednotkách homol rok^{-1} a člověk rok^{-1} ? Předpokládejte lineární růst počtu obyvatel.
7. Jak by se změnila homolární koncentrace obyvatel, kdyby město nezvysalo svou rozlohu mezi léty 6022 a 6626?
8. Město se ale rozšíralo také a to lineárně rychlostí 9,685 jítro rok^{-1} . Jaká je tedy potom homolární koncentrace obyvatel ve městě v roce 6626? Stručně se k tomuto demografickému ukazateli vyjádřete.

6 bodů



Obrazek 2: Hoření dřeva: Nejdříve dochází k pyrolyze dřeva na lehké uhlovodíky, ty se dále teplém rozkládají a oxidují (mnohdy nedokonale), což uvolňuje teplo oxidače úphná (na oxid uhličitý) nebo neúphná (na oxid uhelnatý, případně na saze) rozhoduje teplota plamene a složení hořlavé směsi.
Vliv teploty se mimochodem týká i zachování těl v ohni. Těla se v ohni poměrně zachovávají. Kremace probíhá zhruba při 800 °C udržovaných po dobu dvou hodin. Onej místnosti sice může dosahovat až 1100 °C, ale většinou jen na příliš krátkou dobu, než shoří jeho palivo. U těl se nejdřív vypařuje voda, a tak se zkracují svály až do typického „boxerského“ postoje. Ale i zuhelnatělá těla jsou uvnitř poměrně zachovává a dá se z nich stále poznat třeba otrava jedem nebo zranění.

Termodynamika hoření

Aby byla reakce samovolná, musí při ní růst neuspořádanost (entropie) soustavy ($\Delta S > 0$). Tato podmínka je splněna vzhledem k tomu, že při hoření vznikají plyny, které jsou rozehodně méně uspořádaným systémem molekul, než bylo předchozí dřevo. Dalším ukazatelem proveditelnosti reakce je pokles Gibbsovy volné energie G v soustavě ($\Delta G < 0$). Ta je definována pomocí entalpie H (tepla) a entropie S (neuspořádanosti):

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (1)$$

Úloha č. 3: Inkvizitorovo dilema 8 bodů



Úloha č. 3: Inkvizitorovo dilema

Autoři: Eva Jeníčková a Jana Zikmundová

Ztřá... Do zůtrka se musím rozhodnout. A věřte mi, vůbec to není lehké. Samozřejmě, je mou povinností předně chránit naši velkou matku církev a její ovečky, ale ta babka vypadá ucelku neškodně. Bratr Justýn, který ji vyslýcháhal, je sice o její vině plně pøesvědčen, ale já si stále nejsem jistý. Podle mèho názoru by bratr Justýn byl schopen upátk i našeho biskupa. Má obrovský zápal pro věc, abych tak řekl.

A jak to vlastně celé bylo?

Letošní rok se vùbec nevydařil. Hned zjara přišly povodnì, v létì zas vyhorěl kostel po úderu blesku. V celém kraji se také silně pøemnožili vlny. Po sklizni se začaly dít už úplně dìvné vèíci. Mnoho lidí onemocnìlo – některí jen trpeli prýjmy nebo zvracení, ale některým – bože, chraň – zčernaly prsty či celé konèetiny, jakoby hořeli zezítr. Tři nebo čtyři lidé íupní zezítrali a zemřeli, nebo se sami zabili.

A přibližnì v té dohle, kdy podivná epidemie vrcholila, se ve městě objevila stará Šrucha s nùší plnou podivných vèíci. Bohužel (či bohužal?) šel ten den na trh i bratr Justýn. Hned babku odblekl do šatlavy. Trvá na tom, že jde o čarodìjnici a že je nutné ji popravit. Nejvyššísm církveùm představeným ve městě jsem ovšem já, a proto je rozhodnutí na mě...

Otec Metodéj pro mě sestavil seznam toho, co Šrucha ve své nùši přinesla:


- prášek z kýchavice
- kapky z ocámu
- prášek z kořene šalamounku
- vrbonou kùru
- několik kloboučkù muchomùrký červené
- stirup z náprstníku
- sušené lístky meduèdice
- sušenou dobromysl

Typ hoření	plameny, deflagrace	výbuchy, detonace
Forenzní použití	žhářství, boj s ohnem	střelné zbraně, balistika
Rychlost hoření	subsonická	supersonická rychlosť zvuku ^a
Palivo ^b / typické vazby	hořlaviny C-H, H-H, C=C	výbušníny C-O, C=O
Okysličovadlo	vzduch, O ₂	KNO ₃ , nitro-slučeniny
Vytvárený tlak	nízký	střední
Typ procesu	termický	mechanický (tlaková vlna)
Příklady	celulóza	střelný prach
		TNT, RDX, PETN

^aNa vzduchu při 0 °C je rychlosť šíření zvuku 330 m s⁻¹.

^bPro přehlednost vynechány anorganické látky jako například Mg, Na, U, Pu ...

Tabulka 1: Rozdíly mezi ohněm a výbuchy



1. Vliv jednotlivých faktorù hoření: Bez okysličovadla k reakci nedojde, je zapotřebí teplo k provedení reakce a reakce uvolní teplo

1. Zjistìte hlavní účinné látky všech zmíněných rostlin a rozřaďte je do skupin (fenolická látka, glykosid, pseudoalkoid, protoalkoid, aminokyselina, terpen).

2. Uveďte možný zpùsob použití prospěšného člověku.

3. Léčivé rostliny se upravovaly různým způsobem. Uveděte, jak se od sebe liší nálev, odvar, sirup, macarát a tinktura.

4. Co způsobilo onu zmíněnou záhadnou epidemii? Existuje více forem této nemoci? Pokud ano, jak se liší?

5. Pomozte vyřešit inkvizitorovo dilema! Má dát příchod vášni bratra Jusťma, nebo ne?

Seriál o detektivní chemii – Příběhy žáru a výbuchů

Autor: Karel Berka

Detectiv Chemie se rozhlédl po tom, co zbylo z kuchyně. „Nejvíc černé zdi jsou kolem sporáku a hlavně trouby, to se dalo čekat,“ pomysel si detektiv. Pohled mu zabloudil na rozsekáné okno, kterým sem dopadalo světlo. Ale k oknu nedvedla černá stopa, která by napovídala, že bylo otevřené v době požáru. Ohořelý byl předeším pás ve výši očí, což by odpovídalo hoření plynu. Že by přece jen samovolně chytl plyn z trouby, který někdo zapomněl zavřít?

Detectiv se opatrně přiblížil ke sporáku a jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že jede o sporák elektrický a v troubě byla plynnová bomba.

„To mi řekněte, Omáčko, jak někoho může napadnout dát do elektrické trouby plynnovou bombu? Žhář byl bud' neuveritelně geniální, nebo naopak neuvěřitelně hloupý...“ detectiv nevěřitelně zaúřízl hlavou a šel se poptávat majitele, zda jezdí občas na čundr.



Úloha č. 4: Radioaktivní syntéza II

Autor: Pavel Řezanka

V úloze Radioaktivní syntéza I jsme se zabývali přípravou značených organických látěk z anorganických. Pro studium biochemických pochodů je však potřeba připravit složitější organické molekuly, které jsou specificky značeny na daných místech v molekule. A tomu je věnována tato úloha.

Na obrázku 1 jsou uvedeny syntézy jedné biologicky zajímavé molekuly, která obsahuje jeden nebo více značených atomů uhlíku (v tomto případě předpokládejte značení pomocí ^{13}C , resp. ^{14}C) v různých místech molekuly.

Nápověda:

- Znak Δ znamená zahřátí reaktantní směsi.
- DIBAL-H je redukční činidlo, na rozdíl od LiAlH_4 však není produktem alkoholu, ale jeho vyšší oxidační stupně.
- Pokud k daném produktu smířuje více šípek (například látka \mathbf{D}_3), zmáňte to, že daný produkt vznikl ze dvou reaktantů (v případě \mathbf{D}_3 z K^*CN a \mathbf{C}).

1. Nakreslete strukturní vzorce látkek **A** až **H**, vyznačte atomy značené ^{14}C a systematicky je pojmenujte (nemusíte brát do úvahy izotopické značení, tzn. například pro látky **H**₁ až **H**₄ napište pouze jeden název). U látky **H** napишete i triviální název.

Poznámka: Pokud se ve schématu vyskytuje sloučeniny odlišné pouze pozici značeného uhlíku, jsou odlišeny dolním indexem.

Model hoření dřeva

Nejdřív dochází k pyrolytickému rozkladu dřeva (viz obrázek 2). Tím se z něj uvolní lehké uhlíkovodíky, které pak podléhají oxidaci v plameni. Zde bude

12. Z Charlesova zákona pro ideální plyn platí, že $p/T = \text{konst.}$, a tedy musí platit, že $p_1/T_1 = p_2/T_2$. Z tohoto jednoduše vyjádříme $p_2 = p_1 \cdot (T_2/T_1)$, to nám poskytne výsledky $p_2 = 0,96 \cdot 10^5 \cdot (77/297) = 24,9 \text{ kPa}$.

13. Chyba je v tom, že některé plyny obsažené ve vzduchu při teplotě tekutého dusíku kapalní, některé přechází do pevné fáze. Jedním z těchto plynů je i kyslík, který je v kondenzátu téměř výhradně zastoupen. Krystalky odpovídají zmrzlé vzdušné vlnnosti.

14. Jak již bylo řečeno, jedná se o směs zkondenzovaných plynů, jinž ale domuje kyslík. Objem plynného kyslíku v láhví je $V_{O_2(\text{g})} = x \cdot V_{\text{PET}}$. Jeho látkové množství ze stavové rovnice potom $n_{O_2(\text{g})} = (pV_{O_2(\text{g})})/(RT)$. Spojením těchto dvou rovnic dostaneme:

$$n_{O_2(\text{g})} = \frac{pxV_{\text{PET}}}{RT} \quad (9)$$

Objem vzniklého kyslíku získáme ze vztahu $n = m/M$ a $m = \rho V$. Platí tedy, že objem vypočteme jako $V_{O_2(\text{l})} = nM_{O_2}/\rho_{O_2(\text{l})}$. Dosazením tohoto vztahu do rovnice (9) dostaneme výsledný vztah, který po vyčíslení pošytne výsledek:


$$V_{O_2(\text{l})} = \frac{pxV_{\text{PET}}M_{O_2}}{\rho_{O_2(\text{l})}RT} = \frac{0,96 \cdot 10^5 \cdot 0,21 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 31,998 \cdot 10^{-3}}{1140 \cdot 8,314 \cdot 297} \quad (10)$$

Výše uvedený výraz poskytuje výsledek $V_{O_2(\text{l})} = 0,11 \text{ ml}$.

15. Pravděpodobně by došlo k prudké oxidaci hadičky kyšlíkem – možný je i výbuch.

16. Vypařování dusíku je reakce, při které se spotřebuje značné množství tepla. Pokud máme dusík umístěn v nějaké relativně dobré tepelně izolované nádobě, pak teplo, které se spotřebuje na odparení, je vlastně využito k chlazení zbylého dusíku. Proto lze s malým množstvím vystačit relativně dlouho.

Otázka 1 – 0,5 bodu, otázka 2 – 0,4 bodu, otázka 3 – 1,9 bodu, otázka 4 – 1 bod, otázka 5 – 1,9 bodu, otázka 6 – 0,8 bodu, otázka 7 – 0,9 bodu, otázka 8 – 0,7 bodu, otázka 9 – 0,9 bodu, otázka 10 – 0,7 bodu, otázka 11 – 0,6 bodu, otázka 12 – 0,7 bodu, otázka 13 – 0,7 bodu, otázka 14 – 1,6 bodu, otázka 15 – 0,8 bodu a otázka 16 – 0,9 bodu. Celkem 15 bodů.



Obrázek 1: Příprava látky **H** z **KCN**

2. Které z látek **A** až **H** jsou chirální? Vyznačte chirální atomy a napište, kolik možných enantiomerů existuje.

3. Jak se jmenuje skupina látek, do které látky **H** patří?

4. Jak se jmenuje syntéza látky **H** z **KCN**?

5. Pokud byste dostali značenou látku **H**, jak byste určili, na jakých pozicích je značena?

Při práci s izotopy s krátkým poločasem rozpadu, jaký má například ^{11}C ($\tau = 20,4 \text{ minut}$), je potřeba brát do úvahu nejen výtržnost reakce, ale i dobu trvání jejího provedení. Tento fakt si vysvětlíme na sledu reakcí, když ^{11}C ($^{11}\text{C} = ^{*}\text{C}$) připravíme **H₄**. Nejprve označme jednotlivé reakční kroky číslou 1 (vznik **F₄**), 2 (vznik **G₄**) a 3 (vznik **H₄**), příslušné časy pro jednotlivé reakce (jedná se o celkové časy, tzn. včetně přípravy, samotné reakce i zpracování) pak jsou t_1, t_2 a t_3 a výšežejky reakcí jsou η_1, η_2 a η_3 . Mějme nyní dva chemiky, kteří připravili látku **H₄**. První z nich postupoval podle postupu A, druhý podle postupu B.

Po stup A: $t_1 = 0,5$ hod, $t_2 = 0,2$ hod a $t_3 = 1,2$ hod, $\eta_1 = 90\%$, $\eta_2 = 80\%$
a $\eta_3 = 95\%$.
Po stup B: $t_1 = 0,2$ hod, $t_2 = 0,1$ hod a $t_3 = 0,5$ hod, $\eta_1 = 55\%$, $\eta_2 = 35\%$
a $\eta_3 = 40\%$.

6. Pokud do reakce vstupuje 1 mol K^*CN (${}^{11}C = {}^{11}C$), vypočítejte, kolik zís-káme značené látky H_4 podle jednotlivých postupů (A, B). Který postup je tedy výhodnější?

Poznámka: Radioaktivní rozpad je popsán rovnicí kinetiky prvního řádu (1). Aktivita A představuje počet rozpadů za jednotku času. Integraci výrazu (1) získáme závislost počtu částic na čase (2).

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N \quad (1)$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2)$$

N_0 značí počet částic na počátku, N počet častic v čase t a λ rychlosť (rozpadovou) konstantu, která je nepřímo úměrná poločasu rozpadu τ (3).

$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} \quad (3)$$

Délka „prstenu“ je dáná jeho obvodem, tedy $\ell_0 = \pi d_0$. Jeho nový průměr je $d = \ell/\pi$. Nová délka je daná rovnici uvedenou výše, tedy po dosazení:

$$d = \frac{\pi d_0 \cdot (1 + \alpha \Delta T)}{\pi} = d_0 \cdot (1 + \alpha \Delta T) \quad (8)$$

Dosazením do předešloží rovnice máme $d = 1,8 \cdot (1 + 1,9 \cdot 10^{-5} \cdot (-226)) = 1,79$ cm. Ucvaknutí prstu pstenem tedy bezprostředně nelehozi. Nebez-pečí však spočívá v tom, že v okoli prstenu se díky jeho poměrně malé tepelné kapacitě a velké tepelné vodivosti netvorí onen „ochraný polštář“ plynů a velmi reálně tak hrozí opravdové zmrznutí tkáně pod prstenem, náramkem apod.

6. Ano, samozřejmě by se něco stalo a nebylo by to moc příjemné. I onen plynový „polštář“ se totiž ochlazuje (i když relativně pomalu) a při delším ponechání ruky v kapalném dusíku opět hrozí její zmrznutí a tím i nevratné poškození.

7. Vzhledem k tomu, že hadička je vyrobena z pryže, dochází při teplotě tekutého dusíku v její strukturu ke snížení pohyblivosti jednotlivých polymerních jednotek a tím i k celkovému snížení elasticity. Teplota, pod kterou k tomuto dochází, se nazývá teplotou skelného přechodu a je pro každý polymer jiná. Křehkou a ochlazenou pryž lze tedy pod teplotou skelného přechodu rozbit podobně jako talíř nebo sklenici.

8. Při ohřátí na pokojovou teplotu se elasticita kančuku navrátí, protože do-jde k překročení teploty skelného přechodu a tím i zvýšení pohyblivosti polymerních jednotek.

9. Je to způsobeno tím, že při ochlazení kovů dochází ke snížení Youngova modulu pružnosti, s čímž souvisí i zvýšení rychlosti zvuku a snížení tlumení kmitů v látce. Pokud tedy onem ololený zvonec ochladíme na teplotu tekutého dusíku, bude se v něm zvuk šířit lépe než v olovu při pokojové teplotě a zvonec zazvoní.

10. Chemické složení bílého obalu je H_2O . Je to vzdušná vlnkost, která při-mrzla na zchlazené olovo.

11. Zde je opět důvodem poměrně vysoká tepelná vodivost kovů. Když bychom na podchlazený kovový zvonec sáhlí přímo rukou, velmi pravděpodobně bychom k němu přimrzli. Plastová rukojet' s malou tepelnou vodivostí toto riziko částečně eliminuje.

3. Nejednodušší asi bude použít stavovou rovnici ideálního plynu

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad pV = \frac{m}{M} RT \quad (2)$$

Z ní vyjádříme molární hmotnost směsi plynů v trubici s vyroběným dusíkem

$$M = \frac{mRT}{pV}. \quad (3)$$

Předpokládáme-li, že oba dva plyny jsou ideální, je molární hmotnost jejich směsi rovna:

$$M = x_? M_? + x_{N_2} M_{N_2} \quad (4)$$

Porovnáním dvou posledních rovnic dostaneme výraz, ze kterého už molární hmotnost neznámého plynu vyjádříme jako

$$x_? M_? + x_{N_2} M_{N_2} = \frac{mRT}{pV} \quad \Rightarrow \quad M_? = \frac{\frac{mRT}{pV} - x_{N_2} M_{N_2}}{x_?}. \quad (5)$$

Pokud tedy do (5) dosadíme číselné hodnoty (pro dusík $x_{N_2} = 0,9882$, $M_{N_2} = 28,0134 \text{ g mol}^{-1}$), dostaneme molární hmotnost neznámého plynu

$$M_? = \frac{2,1880 \cdot 8 \cdot 314 \cdot 297,15}{0,96 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} - 0,9882 \cdot 28,0134} = 39,9 \text{ g mol}^{-1}. \quad (6)$$

Neznámým plynem je tedy argon, který se opravdu v dusíku vyskytuje protože jej nelze ze vzduchu chemicky odstranit.

4. Tekutý dusík se při kontaktu s rukou, která má teplotu asi o 200 K vyšší, velmi rychle odpařuje a tvorí tak mezi nebezpečně ledovým kapalným dusíkem a rukou jakýsi „izolační polštář“, který zajistí, abychom na krátkou dobu nezmrzli.

5. Jakékoli zkrášlující kovové i nekovové předměty si samozřejmě sundat musíme. Ale ne proto, že by hrzoilo změšení jejich průměru, jak práve ukážeme.

Délka pevného materiálu v závislosti na teplotě je popsána rovnicí

$$\ell = \ell_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T). \quad (7)$$

Úloha č. 5: Atomic Bomberman

Autor: Karel Berka



Atomic Bomberman je stará počítačová hra z doby PC 386. Hra je to jednoduchá a rychlá. Hráč v roli Bombermana pokládá v bludišti bomby, jimiž si otevřá nové prostory a zabijí protihráče, kteří proti němu bojuvali stejnými prostředky. Je otázkou, zda by to tak jednoduché bylo i ve skutečnosti. Asi ne. Ale vybuchovat nám toho bude dost, nebojte. Zaměříme se totiž na chemii výbušnin.

Výbušiny se nejčastěji nazývají látky schopné oxidace, při jejichž aktivaci nastane výbuch. Ale oxidace může probíhat i jinými rychlosťmi.

1. Podle reakční rychlosti oxidace se dají odlišit pojmy: deflagrace, detonace a neexplozivní hoření. Sériádte tyto pojmy podle rychlosti.

2. Jakým z nich se bude nejčastěji označovat oxidace střelivin?
3. Jak byste docílili, aby oxidace střelivin probíhala podle zbyvajících dvou pojmu?

Abyste mohlo dojít k oxidaci, je samozřejmě zapotřebí k látce nejakým způsobem dopravit kyslík. A to buď ze vzduchu, nebo přídáním oxidačního činidla. Některé látky nicméně obsahují dostatek kyslíku pro svou vlastní oxidaci. Jednoduchý způsob, jak spočítat, zda je v látce dostatek kyslíku, představuje tzv. kyslíkový poměr. Jedná se o porovnání počtu atomů kyslíku v molekule výbušiny vůči počtu atomů kyslíku, které by byly v molekulách spalin (CO_2 , H_2O , N_2). Kyslíkový poměr je pak definován jako počet přehývajících nebo coby běžících atomů kyslíku násobený podílem molární hmotnosti kyslíku a molární hmotnosti výbuštiny. Pokud má směs více kyslíku, než by potřebovala, je výsledný kyslíkový poměr větší než nula.

4. Určete kyslíkové poměry pro dusičnan ammoný, nitroglycerin a TNT.
5. Aby se dočílilo největší účinnost výbušnosti, je nejlepší, když má směs kyslíkový poměr rovný nule. Určete molární a hmotnostní zlomek pro nejúčinnější směs TNT a dusičnanu ammoného.
6. Předpokládejte, že vybuchl 1,00 g nitroglycerinu. Určete, kolik molů plynu vzniklo, a pomocí stavové rovnice pro ideální plyn vypočítejte objem plynu při 1 atm a teplotě 25 °C.

⁵Podrobnější definice viz 4. díl seriálu o detektivní chemii.

7. Pomocí shiřovacích tepel určete, kolik se při výbuchu 1,00 g nitroglycerinu uvolnilo energie.

Látky, které v molekule neobsahují kyslík, většinou nejsou samy o sobě výbušné. Ke své oxidaci používají kyslík atmosférický. Nicméně nevybuchují při každém poměru s kyslíkem, ale pouze v rozmezí mezi tzv. spodním výbušným limitem (**LEL** – Lower Explosive Limit) a horním výbušným limitem (**UEL** – Upper Explosive Limit). Limity se dají vyjádřit dvěma rozdílnými způsoby – buď hmotnostními procenty, nebo pomocí poměru látkových množství paliva a okysličovače. Poměr Φ pak udává, jak moc se liší poměr paliva k okysličovači od stechiometrického složení.

8. Proč látka nemůže hořet pod spodním a nad horním výbušným limitem?
9. V kuchyni o rozměrech $4 \times 4 \times 2,5$ m je porouchaný sporák, ze kterého se začal uvolňovat zemní plyn rychlostí zhruba 100 gramů za hodinu. Methan má meze hořlavosti $\Phi = 0,5\text{--}1,6$. Za jak dlouho bude mít methan výbušnou koncentraci? Předpokládejte, že vzduch v místnosti obsahoval 21 mol. % kyslíku při tlaku 1 atm a teplotě 25°C a kuchyně je uzavřeným systémem.
10. Vyrazil by methan dveře a okna? Snesly by dveře a okna mechanickou explozi? A co termickou? Dveře vydrží stabilní rozdíl tlaků 1,0 atm a olzna 0,1 atm. Nárazové vzdálenosti vzdoru 10× méně. Při výbuchu může teplota v místnosti vzrůst i o 1000°C . $C_V(\text{vzduch}) = 20,85 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
11. Mimochodem, bombu lze vyrobít i ze suchého ledu. Navrhnete jak. Jaké chemické stopy byste na místě výbuchu takové bomby našli?
12. Co by se stalo, použili by se místo suchého ledu kapalný dusík?

Potřebné údaje

Látka (skupenství)	$\Delta_{\text{sluč}}H^\circ [\text{kJ mol}^{-1}]$
$\text{CO}_2 (\text{g})$	-393,51
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,83
methan (g)	-74,78
nitroglycerin (s)	-364

Tabulka 1: Standardní slučovací entalpie sloučenin. Prvky v základním stavu mají slučovací entalpii rovnou nulu.

7. Pomocí shiřovacích tepel určete, kolik se při výbuchu 1,00 g nitroglycerinu uvolnilo energie.


Látky, které v molekule neobsahují kyslík, většinou nejsou samy o sobě výbušné. Ke své oxidaci používají kyslík atmosférický. Nicméně nevybuchují při každém poměru s kyslíkem, ale pouze v rozmezí mezi tzv. spodním výbušným limitem (**LEL** – Lower Explosive Limit) a horním výbušným limitem (**UEL** – Upper Explosive Limit). Limity se dají vyjádřit dvěma rozdílnými způsoby – buď hmotnostními procenty, nebo pomocí poměru látkových množství paliva a okysličovače. Poměr Φ pak udává, jak moc se liší poměr paliva k okysličovači od stechiometrického složení.

8. Proč látka nemůže hořet pod spodním a nad horním výbušným limitem?
9. V kuchyni o rozměrech $4 \times 4 \times 2,5$ m je porouchaný sporák, ze kterého se začal uvolňovat zemní plyn rychlostí zhruba 100 gramů za hodinu. Methan má meze hořlavosti $\Phi = 0,5\text{--}1,6$. Za jak dlouho bude mít methan výbušnou koncentraci? Předpokládejte, že vzduch v místnosti obsahoval 21 mol. % kyslíku při tlaku 1 atm a teplotě 25°C a kuchyně je uzavřeným systémem.
10. Vyrazil by methan dveře a okna? Snesly by dveře a okna mechanickou explozi? A co termickou? Dveře vydrží stabilní rozdíl tlaků 1,0 atm a olzna 0,1 atm. Nárazové vzdálenosti vzdoru 10× méně. Při výbuchu může teplota v místnosti vzrůst i o 1000°C . $C_V(\text{vzduch}) = 20,85 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
11. Mimochodem, bombu lze vyrobít i ze suchého ledu. Navrhnete jak. Jaké chemické stopy byste na místě výbuchu takové bomby našli?
12. Co by se stalo, použili by se místo suchého ledu kapalný dusík?


Úloha č. 5: Legrácky s tekutým dusíkem (I)

Autor: Raděk Matuška

1. Běžně se dnes dusík získává zkапalněním vzduchu a jeho následnou frakcí destilací a zpětným zkапalněním dusíku. Vynálezec je Carl von Linde a spojitosť názvu firmy *Linde Technoplyn* s jeho jménem není čistě náhodná.
2. Rozklad probíhá podle rovnice




Obrázek 2: Třídy sloučenin **Z₁–Z₅**




7. Vzniká CH_3COOH a imidazol; $^{13}\text{CO}_2$ opustil reakční směs už při přípravě **Y₃**.


8. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




9. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




10. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




11. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




12. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




13. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




14. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




15. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




16. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




17. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




18. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




19. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




20. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




21. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




22. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




23. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




24. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




25. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




26. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




27. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




28. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




29. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




30. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




31. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




32. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on



33. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on




34. a) vzniká její laktam: 3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on, b) vzniká 3-fenylo-4-oxadiazol-5-on neboli 3-fenylo-1-oxa-2,4-diazacyklopent-2-en-5-on [1,2,4]oxadiazol-5-on





Úloha č. 4: Látka X

Autor: Zbyněk Rohlík

1. **A:** imidazol, **B:** fosgen, **C:** chlorid imidazolia, **D:** oxid uhlicity, **X:** 1,1'-karbonyldiimidazo (CDI) nebo li bis(imidazol-1-v)keton




2. Reakce (1) a (2):



3. Klasická aparatura pro jímání plynu nad vodou; přesná navážka CDI rozložena nadbytkem vody, vzniklý plyn jímán nad vodou; výpočet ze stavové rovnice ideálního plynu (p , T , V), oprava na tenzi vodní páry a rozumnost CO_2 ve vodě (případně předem nasycené)

1



Obrázek 1: Intermediáty Y_1 - Y_3

5. Třídy sloučenin **Z₁–Z₅** se nazývají: dialkylkarbonáty (estery kyseliny uhličité); *O*-alkyl-*N*,*N*-dialkylkarbamáty (estery kyseliny dialkylkarbamové); *N,N,N',N'*-tetraalkylmočivny; estery/laktony; amidy/laktamy.

Tabuľka 1: Všetky možnosti genotypu kresních skupin dětí

11 bodů

Řešení úloh 3. série 6. ročníku KSICHTu



Íísha č 1: Kdanak je tatínok? 8 hodů

Si vous avez des questions, je tâcherai de répondre.

1. Rodiče **AB** mají dva syny **RT** a rodiče **CD** mají syna **S** a dceru **P**



2. Reakce (1) a (2):



- Obrazek 1: Vztahy mezi rodiči a dětmi v naší skupině

2. Jestliže má rodič **A** krevní skupinu A, jsou zde dvě možnosti jeho genotypu (**AA**, nebo **A0**). Rodič **B** pak může mít genotyp **BB** nebo **B0**.

B/A	A	A	A	0	$AB/0$	0	0
B	AB	AB	AB	$B0$	A	$A0$	$A0$
B	AB	AB	AB	$B0$	B	$B0$	$B0$
B	AB	AB	AB	AB	$B0$		
0	$A0$	$A0$	$A0$	00			

3. Jejich děti R a T mohou mít libovolnou kremí skupinu (viz tabulka 1)

Naproti tomu děti **P** a **S** mají každé 50% šanci mít pouze skupinu A nebo skupinu B.

4. V celém lidském genomu se vyskytne v průměru 3600 mutací.

$$\text{množství mutací} = \text{velikost genomu} \cdot \text{chybovost} \\ = 3 \cdot 10^9 \cdot \frac{1}{8,3 \cdot 10^5} \approx 3600 \quad (1)$$

Pravděpodobnost výskytu mutace se vypočítá podobně, jen místo velikosti genomu doplníme velikost DNA v repetitivních kouscích DNA (10 · 50 bp). Pravděpodobnost výskytu mutace je pak $6,02 \cdot 10^{-4}$, takže přesnost metody je cca 99 %.

5. Proteiny jsou rozděleny podle účasti na rekombinaci v tabulce 2.

protein	funkce
DNA polymeráza	na základě jednoho vlákna DNA syntetizuje druhé vlákno z nukleosid trifosfátů
ligáza	spojuje zlomy v DNA
rekombináza	hlavní motor celé rekombinace, drží u sebe vlákna DNA a vytváří jejich komplexy
topozizomeráza	vytváří zlomy v DNA, které jsou potřebné k zahájení rekombinace
fosfatázáza	odštěpuje fosfátové zbytky z proteinů
elastáza	štěpí elastinová vlákna
jaderný importin	protein umožňující specifický transport proteinů do jádra
RNA polymeráza	syntetizuje RNA podle DNA templátu
telomeráza	syntetizuje koncové chromozomové úseky – telomery

Tabulka 2: Proteiny účastnící se rekombinace (horní polovina tabulky) a neúčastníci se rekombinace (dolní polovina tabulky)

6. Robin Holliday (obrázek 2), je po něm pojmenována struktura vznikající při DNA rekombinaci – tzv. Holliday junction.

7. Rozvrstvení krevních skupin jak řešitelů, tak i autorič celkem pěkně kopíruje rozložení krevních skupin v populaci ČR (obrázek 3). Škoda jen, že

9. CO₂ je možné z atmosféry odstraňovat pohlcováním v alkalickém hydroxidu (opět je nejvhodnější LiOH, protože je nejlehčí):



Kyslík je možné transportovat v tlakových lahvích, což je ovšem prostorově náročnejší než vozit s sebou pevný peroxid. Další možností, využívanou třeba nukleárními ponorkami, je výroba kyslíku elektrolyzou vody. Pochopitelně toto si mohou dovolit právě nukleární ponorky, které mají vlastní reaktor a tedy relativní přebytek elektrické energie a v neposlední řadě spoustu vody všude kolem sebe, pro vesmírné lodě je to krajně nevhodné.

10. Díky všem, kteří odpovíděli, za názory. Dopadlo to poměrně jednoznačně, z 61 dosluhých řešení 44 vyjadřovalo názor, že ve vesmíru nejsme sami, 6 z vás si myslí, že sami jsme. 10 řešitelů na otázku č. 10 neodpovědělo a 1 je rozpolcen, myslí si, že na 50 % jsme sami a na 50 % ne. Vaše nejčastější odpovědi se týkaly jednak „pouhé“ statistiky, tedy myšlenky typu vesmír je tak velký, že už ze statistického hlediska by nějaká forma života někde existoval měla. Mnoho z vás ovšem polemizuje s „klasickou“ představou zelených mužíčků s anténkama a vyjadřuje názor, že život sice existuje, ale jestli je to forma inteligentní, mající vlastní civilizaci podobnou té násí, je ve hvězdách.

Podobně dopadl i průzkum mezi organizátory KSICHTu, z 13 oslovených si 10 organizátorů myslí, že život ve vesmíru existuje, 3 si myslí opak.


Otázka 1 – 0,5 bodu, otázka 2 – 2 body, otázka 3 – 1,5 bodu, otázka 4 – 1,5 bodu, otázka 5 – 1 bod, otázka 6 – 1,5 bodu, otázka 7 – 1,25 bodu, otázka 8 – 1 bod, otázka 9 – 1,5 bodu a otázka 10 – 0,25 bodu. Celkem 12 bodů.

jeho ztrátu. Proto je nutné kapalný vodík nejprve převést na *p*-izomer (to je údajně technologicky řešeno mj. cíleně trochu rezavým potrubím – jak bylo zmíněno výše, oxid železitý, tedy rez, katalyzuje přeměnu *o*-vodíku na *p*-vodík) a získaný *p*-H₂ chladit, aby nedocházelo k jeho zpětné přeměně. Pro úphnost je třeba podotknout, že tento problém nepostihuje jen inženýry v kosmických agenturách, ale kohokoliv, kdo chce vyrábět/skladovat kapalný vodík.

4.




5. Jedná se o symproporcionaci. Příkladem je třeba reakce sulfanu s oxidem sířičitým:



6. Reakce methylhydrazinu s N₂O₄ je bezpečnejší a lépe regulačelná. Kyslík s vodíkem totiž po smíchání reagují velmi pomalu, pro explozivní (v tomto případě žádaný) průběh je třeba iniciace v podobě jiskry. Při startu raketoplánu můžeme již chvíli před startem dole u trysek motorů vidět celé svazky jisker zaručující bezpečné zažehnutí paliva v pravý okamžik. Pokud by k zapálení směsi kvůli nějaké závadě nedošlo, palivo by se hrromadilo v tryskách a případný výbuch by mohl mít katastrofální následky, obzvláště ve vesmíru, kde by posádka nemohla očekávat brzkou pomoc ze Země. Oproti tomu, jak bylo zmíněno v úvodu k této sadě otázek, směs MeN₂H₃ s N₂O₄ je samozápalná, tedy žádnou iniciaci nepotřebuje, látky po smíchání zreagují a ke zničující explozi nemůže dojít. Kromě toho tento průběh reakce zaručuje přesnéjší manévrování než výbuch kyslíku a vodíku. Jak vidíte, NASA (a všechny obdobné vesmírné organizace) si opravdu vše pojistí, jak jen je to možné.

7. Peroxidů alkaličkých kovů se používá pro regeneraci dýchatelné atmosféry. A plní hned dvojí účel: odstraňuje oxid uhličitý vyprodukovaný astronauty a zároveň ve stejné reakci uvolňuje kyslík potřebný pro dýchání:




8. Nejvyhodnější je peroxid lithný, protože lithium je nejlehčí alkaličký kov a jeho peroxid má tedy nejvyšší procentuální obsah kyslíku (69,74 %) ze všech peroxidů alkaličkých kovů (Na₂O₂ už obsahuje „jen“ 41,04 % atd.). Pro uvolnění stejněho množství kyslíku je tedy třeba menší hmotnost peroxidu, což se pochopitelně počítá v podmírkách, kdy každý gram záteže je třeba dopravit na orbitu.



Obrázek 2: Robin Holliday a Holliday junction


5. Jedná se o symproporcionaci. Příkladem je třeba reakce sulfanu s oxidem sířičitým:
6. Reakce methylhydrazinu s N₂O₄ je bezpečnejší a lépe regulačelná. Kyslík s vodíkem totiž po smíchání reagují velmi pomalu, pro explozivní (v tomto případě žádaný) průběh je třeba iniciace v podobě jiskry. Při startu raketoplánu můžeme již chvíli před startem dole u trysek motorů vidět celé svazky jisker zaručující bezpečné zažehnutí paliva v pravý okamžik. Pokud by k zapálení směsi kvůli nějaké závadě nedošlo, palivo by se hrromadilo v tryskách a případný výbuch by mohl mít katastrofální následky, obzvláště ve vesmíru, kde by posádka nemohla očekávat brzkou pomoc ze Země. Oproti tomu, jak bylo zmíněno v úvodu k této sadě otázek, směs MeN₂H₃ s N₂O₄ je samozápalná, tedy žádnou iniciaci nepotřebuje, látky po smíchání zreagují a ke zničující explozi nemůže dojít. Kromě toho tento průběh reakce zaručuje přesnéjší manévrování než výbuch kyslíku a vodíku. Jak vidíte, NASA (a všechny obdobné vesmírné organizace) si opravdu vše pojistí, jak jen je to možné.
7. Peroxidů alkaličkých kovů se používá pro regeneraci dýchatelné atmosféry. A plní hned dvojí účel: odstraňuje oxid uhličitý vyprodukovaný astronauty a zároveň ve stejné reakci uvolňuje kyslík potřebný pro dýchání:

Srovnání populací krevních skupin




Obrázek 3: Výskyt krevních skupin mezi řešiteli a autory


5. Jedná se o symproporcionaci. Příkladem je třeba reakce sulfanu s oxidem sířičitým:
6. Reakce methylhydrazinu s N₂O₄ je bezpečnejší a lépe regulačelná. Kyslík s vodíkem totiž po smíchání reagují velmi pomalu, pro explozivní (v tomto případě žádaný) průběh je třeba iniciace v podobě jiskry. Při startu raketoplánu můžeme již chvíli před startem dole u trysek motorů vidět celé svazky jisker zaručující bezpečné zažehnutí paliva v pravý okamžik. Pokud by k zapálení směsi kvůli nějaké závadě nedošlo, palivo by se hrromadilo v tryskách a případný výbuch by mohl mít katastrofální následky, obzvláště ve vesmíru, kde by posádka nemohla očekávat brzkou pomoc ze Země. Oproti tomu, jak bylo zmíněno v úvodu k této sadě otázek, směs MeN₂H₃ s N₂O₄ je samozápalná, tedy žádnou iniciaci nepotřebuje, látky po smíchání zreagují a ke zničující explozi nemůže dojít. Kromě toho tento průběh reakce zaručuje přesnéjší manévrování než výbuch kyslíku a vodíku. Jak vidíte, NASA (a všechny obdobné vesmírné organizace) si opravdu vše pojistí, jak jen je to možné.
7. Peroxidů alkaličkých kovů se používá pro regeneraci dýchatelné atmosféry. A plní hned dvojí účel: odstraňuje oxid uhličitý vyprodukovaný astronauty a zároveň ve stejné reakci uvolňuje kyslík potřebný pro dýchání:



5. Jedná se o symproporcionaci. Příkladem je třeba reakce sulfanu s oxidem sířičitým:
6. Reakce methylhydrazinu s N₂O₄ je bezpečnejší a lépe regulačelná. Kyslík s vodíkem totiž po smíchání reagují velmi pomalu, pro explozivní (v tomto případě žádaný) průběh je třeba iniciace v podobě jiskry. Při startu raketoplánu můžeme již chvíli před startem dole u trysek motorů vidět celé svazky jisker zaručující bezpečné zažehnutí paliva v pravý okamžik. Pokud by k zapálení směsi kvůli nějaké závadě nedošlo, palivo by se hrromadilo v tryskách a případný výbuch by mohl mít katastrofální následky, obzvláště ve vesmíru, kde by posádka nemohla očekávat brzkou pomoc ze Země. Oproti tomu, jak bylo zmíněno v úvodu k této sadě otázek, směs MeN₂H₃ s N₂O₄ je samozápalná, tedy žádnou iniciaci nepotřebuje, látky po smíchání zreagují a ke zničující explozi nemůže dojít. Kromě toho tento průběh reakce zaručuje přesnéjší manévrování než výbuch kyslíku a vodíku. Jak vidíte, NASA (a všechny obdobné vesmírné organizace) si opravdu vše pojistí, jak jen je to možné.
7. Peroxidů alkaličkých kovů se používá pro regeneraci dýchatelné atmosféry. A plní hned dvojí účel: odstraňuje oxid uhličitý vyprodukovaný astronauty a zároveň ve stejné reakci uvolňuje kyslík potřebný pro dýchání:



5. Jedná se o symproporcionaci. Příkladem je třeba reakce sulfanu s oxidem sířičitým:
6. Reakce methylhydrazinu s N₂O₄ je bezpečnejší a lépe regulačelná. Kyslík s vodíkem totiž po smíchání reagují velmi pomalu, pro explozivní (v tomto případě žádaný) průběh je třeba iniciace v podobě jiskry. Při startu raketoplánu můžeme již chvíli před startem dole u trysek motorů vidět celé svazky jisker zaručující bezpečné zažehnutí paliva v pravý okamžik. Pokud by k zapálení směsi kvůli nějaké závadě nedošlo, palivo by se hrromadilo v tryskách a případný výbuch by mohl mít katastrofální následky, obzvláště ve vesmíru, kde by posádka nemohla očekávat brzkou pomoc ze Země. Oproti tomu, jak bylo zmíněno v úvodu k této sadě otázek, směs MeN₂H₃ s N₂O₄ je samozápalná, tedy žádnou iniciaci nepotřebuje, látky po smíchání zreagují a ke zničující explozi nemůže dojít. Kromě toho tento průběh reakce zaručuje přesnéjší manévrování než výbuch kyslíku a vodíku. Jak vidíte, NASA (a všechny obdobné vesmírné organizace) si opravdu vše pojistí, jak jen je to možné.
7. Peroxidů alkaličkých kovů se používá pro regeneraci dýchatelné atmosféry. A plní hned dvojí účel: odstraňuje oxid uhličitý vyprodukovaný astronauty a zároveň ve stejné reakci uvolňuje kyslík potřebný pro dýchání:




Úloha č. 2: Kořenový mužík

Autor: Helena Handrková

1. (a) Mandragora lékařská, *Mandragora officinalis* (stáčí rodový název rostliny).

(b) Brambor. Dodávám, že se jednalo o čeled' lilkovité, *Solanaceae*.

2. (a)



Obrázek 1: Tropimon


(b) $-\text{N}(\text{CH}_3)-$

3. (a) arginin

- (b) ornithin, 2,5-diaminopentanová kyselina

4. (a) fenyllalanin \rightarrow fenylyl(b) $-\text{O}-(\text{C}=\text{O})-$

5.



Obrázek 2: Skopolamin

Po 0,8 bodu za otázky 1a, 2a, 3b a po 0,4 bodu za otázky 1b, 2b, 3a, 4a, 4b.
Za správné určení alkaloidu ψ (otázka 5) 0,6 bodu. Celkem 5 bodů.

5 bodů**Literatura**

1. Vondráček V, Riedl O.: Klinická toxikologie, SZN, Praha, 1958
2. Yamada Y, Tabata M: Plant Biotechnology of Tropane Alkaloids, Plant Biotechnology, 14(1); 1-10, 1997

Úloha č. 3: Dobývání vesmíru


Autor: Václav Kubát

1. Bylo to 21. července 1969 v 2.56 UTC (koordinovaný světový čas).

2. Jaderňe spinové izomery dvouatomových molekul vznikají u molekul X_2 , jejichž jáderný spin (analogie spinu elektronu, jen se jedná o jádra) je různý od 0. Každé jádro vodíku má svůj spin (\uparrow nebo \downarrow) a pokud dvě jádra vytvoří molekulu H_2 , mohou nastat dva případy:

- Spojí se jádra se stejným spinem: spiny budou parallelní ($\uparrow\uparrow$), vznikne energeticky bohatší *ortho*-vodík (*o*- H_2)
- Spojí se jádra s rozdílným spinem: spiny budou antiparalelní ($\uparrow\downarrow$), vznikne energeticky chudší *para*-vodík (*p*- H_2)

Tyto izomery se mírně liší svou energií a podle toho budou v závislosti na teplotě vznikat a vzájemně se na sebe měnit. Při 0 K vznikne jen *p*- H_2 , se zvyšující se teplotou bude přibývat *o*-izomeru až se rovnováha ustálí na poměru 75 % *o*- H_2 : 25 % *p*- H_2 zachovaném i za normálních podmínek. Jejich přeměna



může být katalyzována paramagnetickými látkami, např. oxidem železitým.

3. Jaderňa izomerie vodíku má pro raketové palivo nemalý význam. Po-kud totiž do nádrže natankujeme *o*- H_2 (respektive směs izomerů), bude docházet k výše zmíněné exotermické reakci, *o*- H_2 se bude měnit na *p*- H_2 za uvolnění energie, což známená, že soustava se sama ohřívá. Uvolněná energie sice není nijak extrémně vysoká, ale protože výparné teplo vodíku je také nízké, bude to známenat odpaření části potřebného paliva, tedy